

第一章 集合

- 三次数学危机

- 集合是数学中最基本的概念。既然是最基本的概念，就不是很好定义，一般只是说明。要说明什么是集合，有多种描述方法：“所要讨论的一类对象的整体”；“具有同一性质单元的集体”等。当我们讨论某一类对象的时候，就把这一类对象的整体称为集合。而集合中的对象就成为该集合中的元素。
- Cantor是这样描述集合的：所谓集合，是指我们无意中或思想中将一些确定的，彼此完全不同的客体的总和考虑为一个整体。这些客体叫做该集合的元素。

1.2 集合的概念和集合之间的关系

1.3 集合的运算

1.4 基本的集合恒等式

*1.5 集合列的极限

1.2 集合的概念和集合之间的关系

集合的概念

集合的表示

集合间的关系

幂集

集群

集合的概念

- 设 A 是一个集合， a 是集合 A 中的元素 (member)，将这一事实记为 $a \in A$ ，读作 a 属于 A ；若 a 不是集合 A 中的元素，则记为 $a \notin A$ ，读作 a 不属于 A 。
- 例如，一间教室里所有桌子的整体就作为一个桌子集合。每张桌子都属于这个集合，每把椅子就不属于这个集合。

集合的表示

集合用大写字母，集合元素用小写字母。如 $x \in A$, $y \notin A$ 。

- (1) 列举法(listing) ---- 列出集合中的全体元素，元素之间用逗号分开，用花括号{...}括起来。例：设A是由a,b,c,d为元素的集合，B是正偶数集合，则 $A=\{a,b,c,d\}$, $B=\{2,4,6,8,\dots\}$
- (2) 描述法(Abstractio) ---- 通过说明集合中元素所具有的共同的性质来定义一个集合。用谓词 $P(x)$ 表示x具有性质P, $\{x \mid P(x)\}$ 表示具有性质P的集合。例： $P(x)$:x是英文字母, $Q(y)$:y是十进制数字。则 $C=\{x|P(x)\}$ 和 $D=\{y|Q(y)\}$ 分别表示26个英文字母和10个十进制数字集合

注意：

- 1) 集合中的元素各不相同
 - 2) 集合中的元素不规定顺序
 - 3) 集合的两种表示方法有时是可以相互转化的
- 例： $B = \{x | x \in N \text{ 且 } x \text{ 为非0偶数}\}$, 或 $\{x | x = 2(k+1) \text{ 且 } k \in N\}$

几个常用的集合及其记号：

\mathbf{N} (自然数集合): + *封闭,逆运算不封闭

\mathbf{Z} (整数集合): + 及其逆运算,*封闭,但*的逆运算不封闭

\mathbf{Q} (有理数集合): +,*逆运算封闭, 全序域, 具有稠密性
空隙(不连通)

\mathbf{R} (实数集合)

\mathbf{C} (复数集合)

集合之间的关系

- 子集、相等、真子集
- 空集、全集
- 幂集、 n 元集、有限集
- 集族

- 定义1.1 给定集合A和B，如果B中每个元素都是A中的元素，则称B为A的子集(subset)，记作 $B \subseteq A$ 或 $A \supseteq B$ ，读作“B包含于A”或“A包含B”。

$$A \subseteq B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow x \in B)$$

设 $A = \{a, b, c\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $C = \{a, b\}$, 则 $A \subseteq B$, $C \subseteq A$, $C \subseteq B$

按子集的定义，对于任何集合A、B、C，

- (1) $A \subseteq A$ (自反性)
- (2) $(A \subseteq B) \wedge (B \subseteq C) \Rightarrow (A \subseteq C)$ (传递性)

“A是B的子集(subset)”，记作 $A \subseteq B$ 是指：

- (1) A中的所有元素都是B的元素。或者
- (2) 在A中找不到一个不属于B的元素。或者
- (3) 对 $\forall x \in A$ ，均有 $x \in B$ 。

“A不是B的子集”是指：

A中至少有一个元素不属于B。

$(\exists x \in A, \text{ 但 } x \notin B)$

记作 $A \not\subseteq B$ 。

证明： $A \not\subseteq B \Leftrightarrow (\exists x)(x \in A \wedge x \notin B)$

证明： $A \not\subseteq B \Leftrightarrow \neg(A \subseteq B)$

$$\Leftrightarrow \neg((\forall x)(x \in A \rightarrow x \in B))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x) \neg(\neg(x \in A) \vee (x \in B))$$

$$\Leftrightarrow (\exists x)(x \in A \wedge x \notin B)$$

• 定义1.2 两个A和B，若A包含B且B包含A，则称**A与B相等**，记作 $A = B$ 。集合A与B不相等，记作 $A \neq B$ 。

$$A=B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

$$\Leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$$

例：设 $A=\{2\}$, $B=\{1, 4\}$, $C=\{x|x^2-5x+4=0\}$, $D=\{x| x \text{为偶素数}\}$

则 $A=D$, $B=C$

•**定义1.3** 给定集合A和B，如果 $A \subseteq B$ 且 $A \neq B$ ，则称A为B的**真子集**，记作 $A \subset B$ 。

$$A \subset B \Leftrightarrow (\forall x)(x \in A \rightarrow x \in B) \wedge (\exists x)(x \in B \wedge x \notin A)$$

设三个集合A，B，C，从定义可以得到下面3个命题为真：

- (1) $A \not\subset A$;
- (2) 若 $A \subset B$ ，则 $B \not\subset A$;
- (3) 若 $A \subset B$ 且 $B \subset C$ ，则 $A \subset C$

- 空集

定义1.4 不含任何元素的集合叫空集，记作 \emptyset 。

例如， $\Phi = \{x | P(x) \wedge \neg P(x)\}$ ， $P(x)$ 是任意谓词。

$A = \{x | x \in R \wedge x^2 + 1 = 0\}$ 是空集，式中 R 表示实数集合。

- 全集

定义1.5 在研究某一问题时，如果限定所讨论的集合都是某一集合的子集，则称该集合为全集，记作 E 。即

$E = \{x | P(x) \vee \neg P(x)\}$ 。（ $P(x)$ 是任意谓词）

显然，全集的概念相当于论域，它是一个相对概念。

例如，如果讨论 (a, b) 上的实数，就取 (a, b) 为全集。也可以取 $[a, b]$ ， $(a, b]$ ，实数集 R 等为全集。

■ 定理1.1 空集是任意集合的子集。

证明：

■ 推论 空集是唯一的。

证明：反证法

■ 定理1.1 空集是任意集合的子集。

证明：任给集合 A ， Φ 是空集。则 $(\forall x)(x \in \Phi \rightarrow x \in A)$ 永真，这是因为条件式的前件 $(x \in \Phi)$ 永假，所以该条件式对一切 x 皆为真。按子集的定义， $\Phi \subseteq A$ 为真。#

■ 推论 空集是唯一的。

证明：证：假定 Φ_1 和 Φ_2 为二空集。

由定理2， $\Phi_1 \subseteq \Phi_2$ ， $\Phi_2 \subseteq \Phi_1$ 。

再根据定理1， $\Phi_1 = \Phi_2$ 。 #

- 定义1.6 集合A的所有子集构成的集合叫A的幂集 (power set) , 记作 $P(A)$ 。用描述法表示为: $P(A)=\{x \mid x \subseteq A\}$ 。
- 性质
 - (1) $x \in P(A)$ 当且仅当 $x \subseteq A$ 。
 - (2) 设A, B是两个集合, $A \subseteq B$ 当且仅当 $P(A) \subseteq P(B)$ 。

含有n个元素的集合为n元集($n \geq 1$)

例，设 $A = \{a, b, c\}$ ，则

0元子集： Φ ；

1元子集： $\{a\}, \{b\}, \{c\}$ ；

2元子集： $\{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}$

3元子集： $\{a,b,c\}$

$$P(A) = \{\Phi, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a,b\}, \{a,c\}, \{b,c\}, \{a,b,c\}\}$$

定理1.2 设A有n个元素，则P(A)有 2^n 个元素。

证明：A的所有由k个元素组成的子集个数为从n个元素中取k个元素的组合数：

$$C_n^k = \frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k+1)}{k!} \quad (x+y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot x^k \cdot y^{n-k}$$

另外，因 $\Phi \subseteq A$ ，故P(A)中元素的个数N可表示为：

$$N = C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^k + \dots + C_n^n = \sum_{k=0}^n C_n^k$$

在 $(x+y)^n$ 的展开式中令 $x=y=1$ 得：

$$2^n = \sum_{k=0}^n C_n^k = N \quad \#$$

集族：由集合构成的集合

- 定义1.7 设 A 为一个集族， S 为一个集合，若对于任意的 $\alpha \in S$ ，存在唯一的 $A_\alpha \in A$ 与之对应，而且 A 中的任何集合都对应 S 中的某一个元素，则称 A 是以 S 为指标集的**集族**， S 称为 A 的**指标集**。

\emptyset 为**空集族**

定义：设 A 是一个集合。若 A 的元素都是集合，则称 A 为**集合族**。若集合族 A 可表示为 $A = \{S_d | d \in D\}$ ，则称 D 为**集合族A的指标集**。

- 例如

[1] 设 $A_1 = \{x \mid x \in N \wedge x \text{ 为奇数}\}$, $A_2 = \{x \mid x \in N \wedge x \text{ 为偶数}\}$, 则 $\{A_1, A_2\}$ 是以 $\{1, 2\}$ 为指标集的集族

[2] $P(A)$ 是一个集合族, 设 A_1, A_2, A_3, \dots 是集合的序列, 且两两之间互不相同, 则集合 $\{A_1, A_2, A_3, \dots\}$ 是一个集合族, 可表示为 $\{A_i \mid i \in Z\}$, 其中 Z 为自然数集合, 是指标集。

[3] 设 p 是一个素数, $A_k = \{x \mid x \equiv k \pmod p\}$, $k = 0, 1, \dots, p-1$, 则 $\{A_0, A_1, \dots, A_{p-1}\}$ 是以 $\{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ 为指标集的集族

- **多重集合** 设全集为 E , E 中元素可以不止一次在 A 中出现的集合 A , 称为**多重集合**. 若 E 中元素 α 在 A 中出现 k ($k \geq 0$) 次, 则称 α 在 A 中的重复度为 k .
- **例:** 设全集 $E = \{a, b, c, d, e\}$, $A = \{a, a, b, b, c\}$ 为多重集合, 其中 a, b 的重复度为2, c 的重复度为1, 而 d, e 的重复度均为0。

集合可看作是各元素重复度均小于等于1的多重集合。

1.3 集合的运算

定义1.8 设 A 、 B 为两个集合，称由 A 与 B 的所有元素组成的集合为 A 与 B 的并集(**union**)，记作 $A \cup B$ ，称 \cup 为并运算符， $A \cup B$ 的描述法表示为 $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

设： $A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge 5 \leq x \leq 10\}$ ， $B = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x \leq 10 \wedge x \text{ 为素数}\}$ ，

则 $A \cup B = \{2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$

集合的并运算可以推广到有限个或可数个集合

对于可数个集合 $A_1, A_2, \dots,$

记 $A_1 \cup A_2 \cup \dots = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 为并集

设 $A_n = \{x \mid x \in R \wedge n-1 \leq x \leq n\}, n=1, 2, \dots, 10,$ 则

$$\bigcup_{i=1}^{10} A_n = \{x \mid x \in R \wedge 0 \leq x \leq 10\} = [0, 10]$$

定义1.9 设A、B为两个集合，称由A与B的公共元素组成的集合为A与B的交集(**intersection**)，记作 $A \cap B$ ，称 \cap 为**交运算符**， $A \cap B$ 的描述法表示为 $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

设： $A = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge 5 \leq x \leq 10\}$ ， $B = \{x \mid x \in \mathbb{N} \wedge x \leq 10 \wedge x \text{为素数}\}$ ，

则 $A \cap B = \{5, 7\}$

集合的交运算可以推广到有限个或可数个集合

设 $A_n = \{x \mid x \in R \wedge 0 \leq x \leq n\}$, $n=1, 2, \dots$, 则

$$\bigcap_{i=1}^{\infty} A_n = \{x \mid x \in R \wedge 0 \leq x \leq 1\} = [0, 1]$$

定义1.10 设A、B为两个集合，若 $A \cap B = \emptyset$ ，则称A,B是不交的(disjoint)，设 A_1, A_2, \dots 是可数个集合，若对于任意的 $i \neq j$ ，均有 $A_i \cap A_j = \emptyset$ ，则称 A_1, A_2, \dots 是不相交的

设 $A_n = \{x \mid x \in R \wedge n-1 < x < n\}$, $n=1, 2, \dots$, 则
 A_1, A_2, \dots 是互不相交的

定义1.11 设A、B为两个集合，称属于A而不属于B的全体元素组成的集合为B对A的**相对补集(difference)**，记作 $A - B$ ，称 $-$ 为**相对补运算符**， $A - B$ 的描述法表示为

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

定义1.13 设E为全集， $A \subseteq E$ ，称A对E的相对补集为A的**绝对补集(complement)**，并将 $E - A$ 简记为 $\sim A$ ，称 \sim 为**绝对补运算符**， $\sim A$ 的描述表示为 $\sim A = \{x \mid x \in E \wedge x \notin A\}$

定义1.12 设 A 、 B 为两个集合，称属于 A 而不属于 B ，或属于 B 而不属于 A 的全体元素组成的集合为 A 与 B 的**对称差**，记作 $A \oplus B$ ，称 \oplus 为对称差运算符， $A \oplus B$ 的描述法表示为 $A \oplus B = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \notin A \wedge x \in B)\}$

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A) = (A \cup B) - (A \cap B)$$

设： $A = \{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge 0 \leq x < 2\}$, $B = \{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge 1 \leq x < 3\}$, 则

$$A - B = \{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge 0 \leq x < 1\} = [0, 1)$$

$$B - A = \{x \mid x \in \mathbb{R} \wedge 2 \leq x < 3\} = [2, 3)$$






$$A \oplus B = [0, 1) \cup [2, 3)$$

将 \mathbb{R} 作为全集，则

$$\sim A = (-\infty, 0) \cup [2, +\infty)$$

文氏图：用矩形代表全集，用圆或其他闭合曲线的内部代表E的子集，并将运算结果得到的集合用阴影部分表示。

用文氏图可将集合表示如下：



$$A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$$

$$A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$$

$$A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$$

$$A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$$

$$\sim A = \{x \mid x \in E \wedge x \notin A\}$$

注意：文氏图只是对某些集合之间的关系及运算结果给出一种**直观而形象的示意性的表示**，而**不能用来证明**集合等式及包含关系。

例1 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 4\}$, $C = \{3\}$ 。求 $A \cup B$, $B \cup A$,
 $A \cap B$, $B \cap A$, $A - B$, $A \oplus B$, $C \cap A$, $B \cap C$ 。

解:

例2 设 $E = \{a, b, c, d\}$, $A = \{a, c\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $C = \emptyset$,
求 $\sim A$, $\sim B$, $\sim C$ 。

解:

例1 设 $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 4\}$, $C = \{3\}$ 。求 $A \cup B$, $B \cup A$
 $A \cap B$, $B \cap A$, $A - B$, $A \oplus B$, $C \cap A$, $B \cap C$ 。

解: $A \cup B = \{1, 2, 3, 4\} = B \cup A$

$$A \cap B = \{1\} = B \cap A$$

$$A - B = \{2, 3\} \quad A \oplus B = \{2, 3, 4\}$$

$$C \cap A = \{3\}, \quad B \cap C = \emptyset$$

例2 设 $E = \{a, b, c, d\}$, $A = \{a, c\}$, $B = \{a, b, c, d\}$, $C = \emptyset$,
求 $\sim A$, $\sim B$, $\sim C$ 。

解: $\sim A = \{b, d\}$, $\sim B = \emptyset$, $\sim C = \{a, b, c, d\} = E$ 。

定义1.14 设 \mathcal{A} 为一个集族，称由 \mathcal{A} 中全体元素的元素组成的集合为 \mathcal{A} 的广义并集，记作 $\cup \mathcal{A}$ ，称 \cup 为广义并运算符，读作“大并”(Big U)， $\cup \mathcal{A}$ 的描述法表示为

$$\cup \mathcal{A} = \{x \mid \exists z (z \in \mathcal{A} \wedge x \in z)\}$$

例：设 $A = \{\{a,b\}, \{c,d\}, \{d,e,f\}\}$ ，则 $\cup A = \{a, b, c, d, e, f\}$

定义1.15 设 \mathcal{A} 为非空的集族，称由 \mathcal{A} 中全体元素的公共元素组成的集合为 \mathcal{A} 的广义交集，记作 $\cap \mathcal{A}$ ，称 \cap 为广义交运算符，读作“大交”(Big Arch)， $\cap \mathcal{A}$ 的描述法表示为

$$\cap \mathcal{A} = \{x \mid \forall z (z \in \mathcal{A} \rightarrow x \in z)\}$$

例：设 $A = \{\{1,2,3\}, \{1,a,b\}, \{1,6,7\}\}$ ，则 $\cap A = \{1\}$

广义并、广义交 举例

- 设 $\mathcal{A}_1 = \{a, b, \{c, d\}\}$, $\mathcal{A}_2 = \{\{a, b\}\}$, $\mathcal{A}_3 = \{a\}$,
 $\mathcal{A}_4 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $\mathcal{A}_5 = a$ ($a \neq \emptyset$), $\mathcal{A}_6 = \emptyset$, 则

广义并、广义交 举例

- 设 $\mathcal{A}_1 = \{a, b, \{c, d\}\}$, $\mathcal{A}_2 = \{\{a, b\}\}$, $\mathcal{A}_3 = \{a\}$,
 $\mathcal{A}_4 = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$, $\mathcal{A}_5 = a$ ($a \neq \emptyset$), $\mathcal{A}_6 = \emptyset$, 则
 $\cup \mathcal{A}_1 = a \cup b \cup \{c, d\}$, $\cap \mathcal{A}_1 = a \cap b \cap \{c, d\}$,
 $\cup \mathcal{A}_2 = \{a, b\}$, $\cap \mathcal{A}_2 = \{a, b\}$,
 $\cup \mathcal{A}_3 = a$, $\cap \mathcal{A}_3 = a$
 $\cup \mathcal{A}_4 = \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\}$, $\cap \mathcal{A}_4 = \emptyset \cap \{\emptyset\} = \emptyset$,
 $\cup \mathcal{A}_5 = a$, $\cap \mathcal{A}_5 = a$
 $\cup \mathcal{A}_6 = \emptyset$, $\cap \mathcal{A}_6 = \text{E}$ (或者无定义)

运算的优先级

- 第一类运算：绝对补，求幂集，广义并，广义交
 - 按由右到左的顺序进行
- 第二类运算：并，交，相对补，对称差
 - 往往由括号决定，按左向右的顺序进行

有穷集合的计算—包含排斥原理 (Inclusion-Exclusion Principle)

- 设 A_1, A_2, \dots, A_n 为 n 个集合，则


$$\begin{aligned} |\bigcup_{i=1}^n A_i| &= \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{i < j} |A_i \cap A_j| + \sum_{i < j < k} |A_i \cap A_j \cap A_k| - \dots \\ &\quad + (-1)^{n+1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_k| \end{aligned}$$

此定理称为包含排斥原理，简称容斥定理

容斥原理(证明)


- $n=2$ 时的情况:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$



- 归纳证明: 以 $n=3$ 为例:

$$\begin{aligned} |A \cup B \cup C| &= |(A \cup B) \cup C| = |A \cup B| + |C| - |(A \cup B) \cap C| \\ &= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| - |(A \cap C) \cup (B \cap C)| \\ &= |A| + |B| - |A \cap B| + |C| \\ &\quad - (|A \cap C| + |B \cap C| - |(A \cap C) \cap (B \cap C)|) \\ &= |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| \\ &\quad + |A \cap B \cap C| \end{aligned}$$



T

容斥定理的应用

[例1.1] 在1到10000之间既不是某个整数的平方，也不是某个整数的立方的数有多少个？

解：设 $E = \{x \in \mathbb{N} | 1 \leq x \leq 10000\}$, $|E| = 10000$

$A = \{x \in E | x = k^2 \wedge k \in \mathbb{Z}\}$, $|A| = 100$

$B = \{x \in E | x = k^3 \wedge k \in \mathbb{Z}\}$, $|B| = 21$

则 $|\sim(A \cup B)| = |E| - |A \cup B|$

$$= |E| - (|A| + |B| - |A \cap B|)$$

$$= 10000 - 100 - 21 + 4 = 9883$$

注意 $A \cap B = \{x \in E | x = k^6 \wedge k \in \mathbb{Z}\}$, $|A \cap B| = 4$. #

[例1.2] 对24名科技人员进行掌握外语情况的调查，统计资料如下：会说英、日、德、法语的人数分别为13, 5, 10, 9。其中同时会说英语、日语的人数为2，同时会说英语、德语、或同时会说英语、法语，或同时会说德语、法语两种语言的人数均为4，会说日语的人既不会说法语也不会德语，试求只会说一种语言的人数各为多少？又同时会说英、德、法语的人数为多少？

解：设 $E=\{x|x\text{是24名科技人员之一}\}$, $|E|=24$

$$\begin{aligned} A &= \{x \in E | x\text{会说英语}\}, & B &= \{x \in E | x\text{会说日语}\}, \\ C &= \{x \in E | x\text{会说德语}\}, & D &= \{x \in E | x\text{会说法语}\}, \end{aligned}$$

已知：

$$|A \cup B \cup C \cup D| = 24, |A|=13, |B|=5, |C|=10, |D|=9,$$

$$|A \cap B| = 2, |A \cap C| = |A \cap D| = |C \cap D| = 4,$$

$$|B \cap C| = |B \cap D| = |A \cap B \cap C| = |A \cap B \cap D| = |B \cap C \cap D|$$

$$\Rightarrow |A \cap B \cap C \cap D| = 0, |A \cup B \cup C \cup D| = 24$$

$$|A \cup B \cup C \cup D|$$


$$\begin{aligned} &= |A| + |B| + |C| + |D| - |A \cap B| - |A \cap C| - |A \cap D| - |B \cap C| - |B \cap D| \\ &\quad - |C \cap D| + |A \cap B \cap C| + |A \cap B \cap D| + |B \cap C \cap D| + |A \cap C \cap D| \\ &\quad - |A \cap B \cap C \cap D| \end{aligned}$$

把已知代入上面公式可得： $|A \cap C \cap D| = 1$

设只会说英日德法语的人数分别为 x_1, x_2, x_3, x_4 ，则

$$\begin{aligned} x_1 &= |A| - |(B \cup C \cup D) \cap A| = |A| - |(B \cap A) \cup (C \cap A) \cup (D \cap A)| \\ &= 4, x_2 = 3, x_3 = 3, x_4 = 2 \end{aligned} \quad \#$$

- 解(续): 设所求人数分别为 x_1, x_2, x_3, x_4, x (如图),



$A = \{x \in E | x \text{会说英语}\}, |A| = 13$

$B = \{x \in E | x \text{会说日语}\}, |B| = 5$

$C = \{x \in E | x \text{会说德语}\}, |C| = 10$

$D = \{x \in E | x \text{会说法语}\}, |D| = 9$

首先, $x_2 = |B| - |A \cap B| = 5 - 2 = 3$,

其次, 对 A, C, D 用容斥原理, 注意 $|E| = 24$:

$$24 - 3 = 21 = 13 + 10 + 9 - 4 - 4 - 4 + x = 20 + x, \text{ 得 } x = 1,$$

最后, $x_1 = |A| - |A \cap B| - 3 - 3 - 1 = 13 - 2 - 7 = 4$, 同理

$$x_3 = 10 - 3 - 3 - 1 = 3, \quad x_4 = 9 - 3 - 3 - 1 = 2. \quad \#$$

小结

- $\in \emptyset E \subseteq c = P()$
- $\cap \cup - \oplus \sim$

作业

- P20: 3, 6, 8, 10

P21: 13, 16